

Главное, помнить –
туберкулез излечим.

Это не приговор!

Будьте внимательны к
своему самочувствию!



Как происходит заражение туберкулезом?

Туберкулез передается от уже болеющего человека воздушно-капельным, воздушно-пылевым, а также контактно-бытовым путями. Наибольшему риску подвергаются лица, находящиеся в продолжительном близком контакте с больным туберкулезом. Заболеванию способствуют ВИЧ/СПИД, постоянные стрессы, недоедание, плохие бытовые условия, алкоголизм и наркомания, курение, хронические заболевания легких, сахарный диабет, язвенная болезнь.



Туберкулез!!!



Туберкулез—опасное
заболевание, которое
может без правильного
лечения привести к
инвалидности и смерти.

Как можно победить туберкулез?

1. Сделать прививку от туберкулеза. Ее ставят в роддоме при отсутствии противопоказаний в первые 3—7 дней жизни ребенка. В 7 и 14 лет при отрицательной реакции Манту и отсутствии противопоказаний проводят ревакцинацию.

2. Регулярно проходить флюорографическое обследование, не реже 1 раза в 2 года, начиная с 17 лет.

3. Соблюдать правила здорового образа жизни. Регулярные закаливающие процедуры, занятие физкультурой и спортом, здоровое питание, ограничение употребления алкоголя, отказ от табака—эти простые меры способствуют невосприимчивости к туберкулезной инфекции, снижают риск заражения.

4. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы в быту, поддерживать чистоту в помещении: проводить влажную уборку, чаще проветривать, особенно в случае совместного проживания с больным туберкулезом.

5. В случае заболевания туберкулезом необходимо регулярно принимать назначенные врачом противотуберкулезные лекарства.

Важно! Чем раньше будет выявлен туберкулез, тем эффективнее его лечение!

Существуют категории людей, которые больше других подвержены риску заражения туберкулезом:

- ◆ Дети;
- ◆ Пожилые люди;
- ◆ Больные сахарным диабетом;
- ◆ Те, кто проходит лечение лекарствами, ослабляющими иммунную систему;
- ◆ Носители вируса иммунодефицита;
- ◆ Люди, живущие в неблагоприятных условиях;
- ◆ Те, кто страдает от алкогольной и наркотической зависимости;
- ◆ Те, у кого ослаблено общее состояние здоровья;



Как распознать туберкулез?



Если у вас или у вашего ребенка появились слабость, быстрая утомляемость, снижение аппетита, потеря веса, повышенная потливость, повышение температуры, кашель или покашливание—это причина обратиться к вашему лечащему врачу.

Для своевременного выявления заболевания туберкулезом детям ежегодно проводят туберкулиновую пробу.

